

ANTIMICÓTICO TÓPICO

FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO, TÓPICO

INDICACIONES

Tinea pedis, Tinea Cruris, Tinea Corporis y Pityriasis Versicolor.

PRESENTACIONES

Tubo 15 g, Terbinafina 1% crema

POSOLOGÍA

1 aplicación diaria durante:
Tinea Pedis y Tinea Cruris:
 1 semana.
Pityriasis versicolor: 2 semanas.
Tinea corporis: 3 semanas



DANIVETSA

ANTIVIRAL/ANTIHERPÉTICO

DANVIR CREMA



INHIBIDOR SELECTIVO DEL ADN POLIMERASA VIRAL

INDICACIONES

Herpes labial,
Herpes genital,
Varicela,
Herpes Zoster

PRESENTACIONES

Tubo 15 g,
Aciclovir 5% crema

POSOLOGÍA

Aplicar 5 veces al día por 5 días

ANTIHIPERTENSIVO

INHIBidores de la ECA

INDICACIONES

Hipertensión arterial etapa I-II esencial. Hipertensión Renovascular. Insuficiencia cardíaca congestiva y disfunción ventricular izquierda.

PRESENTACIONES

Tabletas, Enalapril Maleato 20 mg, Caja por 30.

POSOLOGÍA

1 Tableta al día.



DANIVETSA

ANTIANÉMICO/SUPLEMENTO DE HIERRO

FERROLATE

HIDROXIDO DE HIERRO POLIMALTOSADO



ANTIANÉMICO/SUPLEMENTO DE HIERRO

INDICACIONES

Prevención y tratamiento en Anemia Feropénica en: Embarazo, Post-parto, crecimiento de los niños y adolescentes, déficit de Hierro en ancianos y vegetarianos estrictos.

PRESENTACIONES

Ampollas bebibles de 5 ml (100 mg de Hierro Elemental) Caja x 10

POSOLOGÍA

1 Ampolla bebible al día x 4 semanas.

ANTIPARASITARIOS

AMEBICIDA, TRICOMONICIDA, GIARDICIDA

INDICACIONES

Tratamiento de amebiasis intestinal y extraintestinal, giardiasis, trichomoniasis urogenital, vaginosis bacteriana.

PRESENTACIONES

Tabletas de 1 g, Caja x 2

POSOLOGÍA

2 g dosis única



DANIVETSA

BENZATEL®
ALBENDAZOL

ANTIHELMÍNTICO DE AMPLIO ESPECTRO

INDICACIONES

Ascaridiasis. Oxiuriasis. Tricocefalosis. Uncinariasis. Estrongiloidiasis. Hidatidosis. Cisticerosis. Teniasis. Giardiasis.

PRESENTACIONES

Suspensión 400 mg Frasco 20 ml Sabor a naranja

POSOLOGÍA

Dosis única de 400 mg / 20 ml de suspensión

POTENCIADOR ERÉCTIL

DISFUNCIÓN ERÉCTIL

INDICACIONES

Tratamiento de la disfunción eréctil

PRESENTACIONES

Sildenafil tabletas 50 mg Caja x 4

POSOLOGÍA

1 tableta una hora antes de la actividad sexual



DANIVETSA



Juntos por su Salud

Matriz Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo Ciudadela Santa Adriana Mz. 21 Solar 3A Telfs.: (593-4) 3084689
 Oficina Quito: Av. 12 de Octubre y Fco. Salazar Edificio Torre Sol Verde 6to piso. Telf.: 2554995 / 2543606
 Oficina Cuenca: Antonio Tamariz 141 y Remigio Crespo, 2do piso - Telf.: (593-7) 2813524
www.danivet.com

ANTIMICROBIANOS / ANTIBACTERIANOS



ANTIBÓTICO BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

INDICACIONES

Infecciones de: Tracto respiratorio superior/inferior, genitourinarias, de piel y tejidos blandos.

PRESENTACIONES

Tabletas, 500 mg (Amoxicilina 250 mg + Pivsulbactam 250 mg), Caja x 10

POSOLOGÍA

1 Tableta cada 8 horas

ANTIBÓTICO BACTERICIDA, CEFALOSPORINA DE SEGUNDA GENERACIÓN

INDICACIONES

Infecciones de: Tracto respiratorio superior/inferior, genitourinarias, de piel y tejidos blandos.

PRESENTACIONES

Tabletas, Cefuroxima 500 mg, Caja x 12
Suspensión, Cefuroxima 250 mg / 5 ml, Frasco 70 ml

POSOLOGÍA

1 Tableta cada 12 horas (7-10 días)
20-30 mg/kg peso/día, repartidos en 2 tomas x 7-10 días



ANTIBÓTICO BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

INDICACIONES

Infecciones gastrointestinales, del tracto genitourinario, de piel y tejidos blandos, respiratorias altas y bajas, y prevención de *Pneumocystosis carinii*

PRESENTACIONES

Tabletas, (Sulfametoxazol 800 mg + Trimetoprima 160 mg, Caja x 10)

POSOLOGÍA

1 Tableta c/12 horas.



SUSPENSIÓN (Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg / 5 ml) Fco. 120 ml

POSOLOGÍA

Menos de 5 años: 2,5 ml c/12 horas
6 - 12 años: 5 ml c/12 horas
+12 años: 10 ml c/12 horas

ANTITUSÍGENOS EXPECTORANTES

BRONCODILATADOR Y EXPECTORANTE

INDICACIONES

Enfermedades broncopulmonares que cursan con tos y broncoespasmos: bronconeumopatías crónicas.

PRESENTACIONES

Jarabe, 120 ml (Salbutamol 2 mg, Guifenesina 100 mg / 5 ml) Sabor a Cereza

POSOLOGÍA

Niños 2-6 años: 0.1 mg/km / dosis 2 a 3 veces al día.

Jarabe, 120 ml (Salbutamol 2 mg, Ambroxol 7.5 mg / 5 ml) Sabor a Manjar de Leche

Niños 6-12 años: 2 mg / dosis 3 veces al día.

Adultos: 2-4 mg / dosis 3 veces al día.



ANALGÉSICO - ANTIPIRÉTICO



ANALGÉSICO - ANTIPIRÉTICO

INDICACIONES

Dolor y fiebre de diversa etiología. Dolor post-traumático o post-quirúrgico. Migrañas y otras formas cefáleas. Mialgias, lumbalgias, bursitis, tendinitis, gota, etc. Dolor odontológico.

PRESENTACIONES

Tabletas, 1 g, Caja por 20

POSOLOGÍA

1 tableta cada 8 horas

Jarabe, 120 ml (Paracetamol 160 mg / 5 ml)

10-15 mg/kg cada 6-8 horas

Gotas, 30 ml (Paracetamol 100 mg / ml)

2 o 3 gotas/kg cada 8 horas

AINE COMBINADO

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANINEURÍTICO

Isquialgia, braquialgia, lumbalgia, epicondilitis lateral y medial, enfermedad de Quervain, síndrome túnel carpiano, mialgias, fibromialgias. Estados dolorosos reumáticos: Artritis gotosa aguda, artrosis, espondilartrosis, poliartritis crónica, espondilitis anquilosante. Neuropatías de diversas etiologías: Mastitis, anexitis, salpingitis, dismenoreas.

PRESENTACIONES

Tabletas Recubiertas (Diclofenaco Sódico 50 mg, Tiamina (Vitamina B1) 50 mg, Piridoxina (Vitamina B6) 50 mg, Cianocobalamina (Vitamina B12) 0.25 mg) Caja x 20

POSOLOGÍA

1 Tableta recubierta cada 8 horas



DANIVETSA

DANIVETSA

DANIVETSA

DANIVETSA

DANIVETSA

ANTIESPASMÓDICO Y ANALGÉSICO

ESPASMOLÍTICO - ANALGÉSICO

INDICACIONES

Síndromes espasmódicos de origen gastrointestinal, hepatobiliar, litiasis biliar, colecistitis. Litiasis renal. Síndrome espasmódico de origen urinario o genital, dismenorrea funcional, tensión premenstrual.

PRESENTACIONES

Tabletas Recubiertas (Clonixinato de Lisina 125 mg + Propinox Clorhidrato 10 mg), Caja x 20

POSOLOGÍA

Adultos y mayores de 12 años: 1 a 2 tabletas cada 6 u 8 horas

PROXINA® CLONIXINATO DE LISINA + PROPINOX CLORHIDRATO



DANIVETSA

ANTIULCEROSOS / DIGESTIVOS



INHIBIDOR DE LA BOMBA DE PROTONES / ANTIULCERO

INDICACIONES

Reflujo gastroesofágico. Úlcera duodenal. Úlcera gástrica. Erradicación del *Helicobacter pylori*. Síndrome de Zollinger Ellison.

PRESENTACIONES

Cápsulas de 20 mg, Caja x 12



DANIVETSA

ANTIACÍDO - ANTIFLATULENTO

INDICACIONES

Hiperacidex y síntomas de desconfort gástrico por meteorismo. Gastritis. Úlcera péptica. Reflujo gastroesofágico. Hernia hiatal.

PRESENTACIONES

Susp. Oral frasco 150 ml (Magaldo. 800 mg + Simet. 60 mg)/ 10 ml

POSOLOGÍA

10 ml de susp. 1 hora después de las comidas y antes de acostarse

ANTIMICÓTICOS SISTÉMICOS

TRIKAX Fluconazol 150 mg



ANTIMICÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

INDICACIONES

Candidiasis vulvovaginal, candidiasis vulvovaginal recurrente. Dermatofitosis (Tinea corporis, cruris y pedis). Onicomicosis.

PRESENTACIONES

Cápsulas de 150 mg Fluconazol, Caja x 2

POSOLOGÍA

Vulvovaginosis candidiásica: 1 cáp. dosis única. C.V.V. Recurrente: 1 cáp. c/3 días x 2 semanas. 1 cáp. semanal x 6 meses.

Onicomicosis: 1 cápsula a la sem. x 3 a 6 meses (manos); 6 a 12 meses (pies)

Tineas: 1 cáp. a la semana x 2 a 4 semanas (corporis y cruris); x 4 a 6 semanas (pedis)



DANIVETSA

ANTIFÚNGICO DE AMPLIO ESPECTRO - GINECOLÓGICO

ANTIFÚNGICO DE AMPLIO ESPECTRO VAGINAL

INDICACIONES

Candidiasis vulvovaginal en adolescentes mayores de 12 años.

PRESENTACIONES

Clotrimazol 500 mg Óvulos vaginales caja x 3.

POSOLOGÍA

1 óvulo vaginal, dosis única.



ANTIFÚNGICO DE AMPLIO ESPECTRO VAGINAL

INDICACIONES

Candidiasis vulvovaginal

PRESENTACIONES

Caja con tubo de 20 mg Clotrimazol 2% crema vaginal con 3 aplicadores.

POSOLOGÍA

Mayores de 12 años: 5 g una vez al día por la noche antes de acostarse, x 3 días.

ANAEROBICIDA/ANTIFÚNGICO/TRICOMONICIDA

ANAEROBICIDA, ANTIFÚNGICO y TRICOMONICIDA

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones vaginales producidas por *Gardnerella vaginalis*, *Cándida albicans*, *Trichomonas vaginalis*, y otros agentes sensibles.

PRESENTACIONES

Óvulos Vaginales sólidos (Metronidazol 500 mg, Nistatina 100.000 UI) Caja x 10

POSOLOGÍA

1 Óvulo antes de acostarse x 10 días



DANIVETSA